

Acnase Creme® - Cada g de creme contém: peróxido de benzoíla - 50 mg enxofre - 20 mg. Associação de álcoois graxos e emulsificantes não iônicos, oleato de decila, glicerina, metilparabeno, propilenoglicol e água purificada q.s.p. - 1 g.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE AÇÃO DO MEDICAMENTO: ACNASE CREME atua no tratamento tópico da acne vulgar leve (cravos e espinhas). Seu mecanismo de ação se deve ao poder bactericida e redutor da oleosidade da pele conferido pelo peróxido de benzoíla e ao poder antisséptico e queratolítico conferido pelo enxofre. A melhora significativa na redução de cravos e espinhas costuma ser observada a partir da 4ª semana de uso de ACNASE CREME, mas o tratamento da acne geralmente leva de 12 a 20 semanas.

INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO: ACNASE CREME é indicado para o tratamento tópico da acne vulgar leve (cravos e espinhas).

RISCOS DO MEDICAMENTO: ACNASE CREME é contraindicado para pessoas hipersensíveis a peróxido de benzoíla, enxofre e demais componentes da formulação e em crianças com menos de 12 anos de idade. **ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA. INFORME AO SEU MÉDICO A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS O SEU TÉRMINO. INFORME AO MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO.**

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: ACNASE CREME é um medicamento somente para uso externo; evite o contato com a mucosa da boca, olhos, pálpebras e outras mucosas, em feridas ou na pele irritada. Se eventualmente isso ocorrer, lave com água em abundância. Este produto pode manchar cabelos e tecidos coloridos, lave as mãos após a aplicação. Devido à possibilidade de hiperpigmentação e para que não haja irritação cumulativa, durante o tratamento evite expor ao sol a área onde o medicamento foi aplicado.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: o uso concomitante de outras preparações tópicas para o tratamento da acne, especialmente abrasivos ou descamantes, pode levar a uma irritação cutânea cumulativa e, por isso, deve ser feito com orientação médica.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS. INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

MODO DE USO. Aspecto físico: verifique se o medicamento que você comprou possui as seguintes características: creme levemente amarelado com odor característico. **ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.** Cuidados de administração: é importante efetuar o teste de adaptação e, só após esse período, seguir a posologia indicada. Após os primeiros dias de aplicação a pele começará a descamar como se tivesse sido queimada pelo sol, podendo ocorrer ardor, ressecamento e vermelhidão, que, se moderados, são normais e desejáveis. ACNASE CREME deve ser aplicado com a ponta dos dedos, espalhando-se cuidadosamente, sem esfregar. Evite usar quantidades exageradas.

TESTE DE ADAPTAÇÃO Primeiro passo: durante 4 dias, antes da aplicação lave o rosto com água e sabonete neutro. Aplique ACNASE CREME na área afetada, deixe o produto em contato com a pele somente 2 horas por dia. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Havendo boa tolerância, siga o segundo passo. Segundo passo: durante 4 dias, antes da aplicação lave o rosto com água e sabonete neutro. Aplique ACNASE CREME na área afetada, deixe o produto em contato com a pele somente 4 horas por dia. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Não ocorrendo desconforto ou intolerância durante esses 4 dias, siga o terceiro passo. Terceiro passo: durante 4 dias, antes da aplicação lave o rosto com água e sabonete neutro. Aplique ACNASE CREME na área afetada, na hora de deitar, e deixe durante a noite. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Após o término da fase de adaptação, utilize o produto normalmente conforme a posologia.

POSOLOGIA: antes de cada aplicação, lave o local com água e sabonete neutro. Aplique ACNASE CREME 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, desde que a área tratada não seja exposta ao sol. Evite o sol intenso, mas, se houver necessidade de exposição moderada ao sol, ACNASE CREME não deve ser usado durante o dia. Nesse caso, após a limpeza da área em tratamento, deve-se aplicar um protetor solar com fator de proteção solar (FPS) 15, no mínimo, dando-se preferência aos produtos não comedogênicos. A melhora significativa na redução de cravos e espinhas costuma ser observada a partir da 4ª semana, mas o tratamento da acne geralmente leva de 12 a 20 semanas. **SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.**

REAÇÕES ADVERSAS: em pessoas hipersensíveis e sensíveis ao peróxido de benzoíla (cerca de 2%), pode haver reação alérgica ou irritativa da pele, incluindo vermelhidão, dor, queimação e coceira exagerada, inflamação, formação de bolhas e crostas ou inchaço no local, ressecamento e descamação. Interrompa o uso do medicamento. Compressas frias no local podem produzir alívio da irritação e o uso de substâncias emolientes e/ou corticosteroides pode ser indicado pelo médico.

CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSAGEM: em caso de superdosagem, suspenda o uso do produto por alguns dias, e a pele voltará ao normal. Para aliviar os sintomas, faça compressas frias no local. Após o desaparecimento dos sinais e sintomas, se a reação for devida ao uso excessivo, e não à alergenidade, deve-se reduzir a frequência de uso do produto.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: o medicamento deve ser mantido bem fechado e armazenado em temperatura ambiente (de 15 a 30°C). Prazo de validade: 24 meses. Vide bisnaga e cartucho. **ATENÇÃO:** não utilize o produto fora do prazo indicado, pois o efeito esperado poderá não ocorrer. **TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.**

Acnase Gel® - Cada g de gel contém: peróxido de benzoíla - 50 mg propilenoglicol, associação de álcoois graxos e emulsificantes não iônicos, coco glicerídeo, éster cáprico caprílico, isononanoato de cetosteáril, sclerotium gum, goma xantana, metilparabeno, propilparabeno, hidróxido de sódio, simethicone emulsão, água purificada q.s.p. - 1 g

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AÇÃO DO MEDICAMENTO: ACNASE GEL atua no tratamento tópico da acne vulgar. Seu mecanismo de ação se deve ao poder bactericida e redutor da oleosidade da pele conferido pelo peróxido de benzoíla.

INDICAÇÃO DO MEDICAMENTO: ACNASE GEL é indicado para o tratamento tópico da acne vulgar.

RISCOS DO MEDICAMENTO: ACNASE GEL é contraindicado para pessoas hipersensíveis ao peróxido de benzoíla e demais componentes da formulação e em crianças com menos de 12 anos de idade. **ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.**

INFORME AO SEU MÉDICO A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS O SEU TÉRMINO. INFORME AO MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS: ACNASE GEL é um medicamento somente para uso externo; evite o contato com a mucosa da boca, olhos, pálpebras e outras mucosas, assim como com feridas ou pele irritada. Se eventualmente isso ocorrer, lave com água em abundância. Este produto pode manchar cabelos e tecidos coloridos, lave as mãos após a aplicação. Devido à possibilidade de hiperpigmentação e para que não haja irritação cumulativa, durante o tratamento evite expor ao sol a área onde o medicamento foi aplicado.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: o uso concomitante de outras preparações tópicas para o tratamento da acne, especialmente abrasivos ou descamantes, pode levar a uma irritação cutânea cumulativa e, por isso, deve ser feito com orientação médica.

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS. INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.

MODO DE USO ASPECTO FÍSICO: verifique se o medicamento que você comprou possui as seguintes características: gel branco, com odor característico.

ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO: é importante efetuar o teste de adaptação e, só após esse período, seguir a posologia indicada. Após os primeiros dias de aplicação, a pele começará a descamar como se tivesse sido queimada pelo sol, podendo ocorrer ardor, ressecamento e vermelhidão que, se moderados, são normais e desejáveis. ACNASE GEL deve ser aplicado com a ponta dos dedos, espalhando-se cuidadosamente, sem esfregar. Evite usar quantidades exageradas.

TESTE DE ADAPTAÇÃO

Primeiro passo: durante 4 dias, antes da aplicação, lave o rosto com água e sabonete neutro. Aplique ACNASE GEL na área afetada, deixe o produto em contato com a pele somente 2 horas por dia. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Havendo boa tolerância, siga o segundo passo.

Segundo passo: durante 4 dias, antes da aplicação, lave o rosto com água e sabonete neutro. Aplique ACNASE GEL na área afetada, deixe o produto em contato com a pele somente 4 horas por dia. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Não ocorrendo desconforto ou intolerância durante esses 4 dias, siga o terceiro passo.

Terceiro passo: durante 4 dias, antes da aplicação, lave o rosto com água e sabonete neutro. Aplique ACNASE GEL na área afetada na hora de deitar e deixe durante a noite. Remova com água e sabonete neutro. Após o término da fase de adaptação, utilize o produto normalmente, conforme a posologia.

POSOLOGIA: antes de cada aplicação, lave o local com água e sabonete neutro. Aplique ACNASE GEL uma ou duas vezes ao dia, de manhã e à noite, desde que a área tratada não seja exposta ao sol. Evite o sol intenso, mas, se houver necessidade de exposição moderada ao sol, ACNASE GEL não deve ser usado durante o dia. Nesse caso, após a limpeza da área em tratamento, deve-se aplicar um bloqueador solar não alcoólico, dando-se preferência aos produtos não comedogênicos. A melhora significativa na redução de cravos e espinhas costuma ser observada a partir da 4ª semana, mas o tratamento da acne, geralmente, leva de 12 a 20 semanas.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

REAÇÕES ADVERSAS: em pessoas hipersensíveis e sensíveis ao peróxido de benzoíla (cerca de 2%), pode haver reação alérgica ou irritativa da pele, incluindo vermelhidão, dor, queimação e coceira exagerada, inflamação, formação de bolhas e crostas ou inchaço no local, ressecamento e descamação. Interrompa o uso do medicamento. Compressas frias no local podem produzir alívio da irritação e o uso de substâncias emolientes e/ou corticosteroides pode ser indicado pelo médico.

CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSAGEM: em caso de superdosagem, suspenda o uso do produto por alguns dias, e a pele voltará ao normal. Para aliviar os sintomas, realize compressas frias no local. Após o desaparecimento dos sinais e sintomas, se a reação for devida ao uso excessivo, e não à alergenidade, deve-se reduzir a frequência de uso do produto.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: o medicamento deve ser mantido bem fechado e armazenado em temperatura ambiente (de 15 a 30°C). Prazo de validade: 24 meses. Vide bisnaga e cartucho.

ATENÇÃO: não utilize o produto fora do prazo indicado, pois o efeito esperado poderá não ocorrer.

PACIENTES IDOSOS: não existem recomendações específicas para pacientes idosos. **TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA 199/2006. AFE N°1.00174-0.**