

Mylanta[®] Plus

hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e simeticona

Sabores Menta ou Morango

Suspensão oral em frasco com 240 mL

USO ADULTO

USO ORAL

ANTIÁCIDO

ALÍVIO RÁPIDO PARA AZIA, MÁ DIGESTÃO, ACIDEZ ESTOMACAL E GASES

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

COMPOSIÇÃO: 400 mg de hidróxido de alumínio, 400 mg de hidróxido de magnésio e 30 mg de simeticona a cada 5 mL.

Excipientes (sabor menta): propilparabeno, sorbitol solução, ácido cítrico, aroma natural de hortelã, essência de limão, metilparabeno, sacarina sódica diidratada e água purificada.

Excipientes (sabor morango): propilparabeno, sorbitol solução, ácido cítrico, aroma artificial de morango, corante vermelho, metilparabeno, sacarina sódica diidratada e água purificada.

INDICAÇÕES: alívio sintomático da acidez estomacal, azia e má digestão associadas ao diagnóstico de úlcera péptica, gastrite, esofagite péptica e hérnia de hiato e também alívio dos sintomas conseqüentes a gases.

CONTRAINDICAÇÕES: MYLANTA[®] PLUS é contraindicado a pacientes que apresentam hipersensibilidade (alergia) a qualquer componente de sua fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: informe a um médico a ocorrência de gravidez durante e após o término do tratamento, ou ainda se estiver amamentando. Pacientes com disfunção renal não devem utilizar o produto.

Atenção: este medicamento contém açúcar, portanto, deve ser utilizado com cautela em diabéticos.

Informe a um médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

REAÇÕES ADVERSAS: alterações discretas de trânsito intestinal, hipermagnesemia, intoxicação por alumínio, encefalopatia, osteomalácia e hipofosfatemia.

Informe a um médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações indesejáveis.

MODO DE USAR: 2 a 4 colheres de chá, de preferência entre as refeições e ao deitar ou de acordo com o critério médico. Não exceder 12 colheres-medida em 1 dia e não utilizar a dose máxima por mais de 2 semanas.

USO ORAL. AGITE BEM ANTES DE USAR.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO: Conservar o medicamento em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

O prazo de validade está indicado na embalagem externa.

Não use o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

MS – 1.5721.0007

Farmacêutica Responsável: Fernanda P. Runha – CRF-SP nº 29.761

Fabricado e Embalado por:

Nycomed Pharma Ltda.

Jaguariúna – SP

CNPJ nº 60.397.775/0008-40

Indústria Brasileira

Registrado por:

Johnson & Johnson INDUSTRIAL Ltda.

Rod. Presidente Dutra, km 154 - São José dos Campos - SP

CNPJ: 59.748.988/0001-14

Serviços ao Consumidor

0800 728 6767

www.jnjbrasil.com.br

172789

Laetus: 287